

Prevención de:
COXSACKIE

SÍNTOMAS DEL VIRUS COXSACKIE

Fiebre alta y repentina

Dolores musculares y de cabeza


Malestar general y pérdida
de apetito

Dolor de garganta y dificultad
para pasar alimentos

Erupción de pequeñas ampollas
en manos, pies y boca

Fatiga e irritabilidad






¿Cómo actuar en la escuela si se detecta el **virus Coxsackie**?

- 1** Informa al docente tus síntomas.
- 2** Acude a la clínica más cercana a tu domicilio.
- 3** La o el director del plantel educativo informará a la jurisdicción sanitaria correspondiente.
- 4** Con el apoyo de la comunidad escolar, se desinfectará el aula y las zonas de uso común.
- 5** La o el alumno que llegue a presentar síntomas permanecerá en su hogar con actividades escolares a distancia.
- 6** Las y los estudiantes se reincorporarán una vez que no tengan síntomas (fiebre y lesiones).



¿CÓMO PREVENGO EL VIRUS COXSACKIE?



El virus coxsackie puede propagarse en entornos escolares y comunitarios.



Lávate las manos con agua y jabón regularmente.



Evita estar en contacto con personas infectadas.



No compartas utensilios, vasos, ni objetos personales.



Mantén limpias las superficies y objetos de uso común.





Cubre boca y nariz al toser o estornudar.



Evita tocarte los ojos, nariz y boca.



Si tu hijo(a) presenta síntomas, como **fiebre, dolor de garganta, llagas en boca, manos y pies**, no lo lles a la escuela y acude a tu unidad médica más cercana.



GRACIAS